

Co należy wiedzieć o leku Kardatuxan?

- Lek Kardatuxan rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Kardatuxan należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, **nigdy nie należy pomijać dawki.**
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Kardatuxan bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko

powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kardatuxan należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Kardatuxan przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

Kiedy należy zasięgnąć porady fachowego personelu medycznego?
Podczas przyjmowania leków

rozrzedzających krew, takich jak Kardatuxan, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie rozpoczynać przyjmowania leku Kardatuxan bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia. Należy niezwłocznie powiadomić fachowy personel medyczny, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi czas,
- krwawienie miesięczkowe lub krwawienie z pochwy o większym nasileniu niż normalnie,
- krew w moczu która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,
- odkrztuszanie krwi lub

Karta ostrzegawcza dla pacjenta

KARDATUXAN 2.5 mg

KARDATUXAN 10 mg

KARDATUXAN 15 mg

KARDATUXAN 20 mg

- Kartę należy zawsze przechowywać przy sobie
- Kartę należy pokazywać przed leczeniem każdemu lekarzowi lub dentyście

wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

Jak przyjmować lek Kardatuxan?

- W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Kardatuxan
 - 2,5 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
 - 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
 - 15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem
 - 20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem.

Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Kardatuxan (rywaroksaban).

Imię i nazwisko:

Adres:

Data urodzenia:

Masa ciała:

Inne leki / choroby:

W nagłym przypadku należy powiadomić:

Imię i nazwisko lekarza:

Telefon lekarza:

Pieczątka lekarza:

Należy również powiadomić:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Pokrewieństwo:

Informacja dla fachowego personelu medycznego:

- Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Kardatuxan i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia Kardatuxan.

PL-PAC-001-1.0, 000000

 **GEDEON RICHTER**