

Lek
APIXABAN GEDEON RICHTER (apiksaban)

Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta

Ta karta powinna zawsze znajdować się przy pacjencie / dziecku / jego opiece.

Należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego przed rozpoczęciem leczenia.

Leczę się przeciwwzakrzepowo z zastosowaniem leku Apixaban Gedeon Richter (apiksaban) w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.

Należy uzupełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Masa ciała:

Dawka: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

Informacja dla pacjentów/opiekunów

- Lek Apixaban Gedeon Richter należy przyjmować/podawać regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia porannej dawki, należy przyjąć/podać tabletkę od razu, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni i może być przyjęta/podana razem z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/podać wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować/podawać dwóch dawek następnego dnia rano, zamiast tego należy

kontynuować przyjmowanie/podawanie leku następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.

- Nie należy przerywać stosowania/podawania leku Apixaban Gedeon Richter bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia u pacjenta udaru mózgu/zakrzepu krwi lub innych powikłań.
- Lek Apixaban Gedeon Richter pomaga w rozrzedzaniu krwi. Jednakże może to zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień w tym

zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, bledność lub osłabienie, nagły, silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.

- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, **należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.**
- W przypadku konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakiegokolwiek zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Apixaban Gedeon Richter.

Październik 2025

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Lek Apixaban Gedeon Richter (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Lek Apixaban Gedeon Richter może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.

-
- Leczenie lekiem Apixaban Gedeon Richter nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagły zabieg chirurgiczny (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)) – patrz ChPL.
 - Dla osób dorosłych dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowany przeciw czynnikowi Xa,

jednak nie ustalono jego bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (patrz charakterystyka produktów leczniczych dla andeksanetu alfa).